위와 대장을 동시에 침범한 거대세포바이러스 위장관 감염

양희찬^{1,2}, 김상욱^{1,2}

전북대학교 의과대학 내과학교실 소화기내과¹, 전북대학교병원 소화기내과²

Cytomegalovirus Infection Associated with Simultaneous Gastric and Colonic Ulcers

Hee Chan Yang^{1,2} and Sang Wook Kim^{1,2}

Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, Jeonbuk National University Medical School¹; Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, Jeonbuk National University Hospital², Jeonju, Korea

증례: 55세 여자가 내원 1주일 전부터 발생한 복통과 설사를 주소로 내원하였다. 내원 18년 전부터 전신성 홍반성 루푸스를 진단받고 스테로이드를 복용 중이었으며, 수술력은 없었고 음주 및 흡연은 하지 않았다. 내원 시 신체 활력징후는 혈압 100/60 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡수 20회/분, 체온 36.2℃였다. 말초혈액 검사에서 백혈구 15,140/μL, 혈색소 9.3 g/dL, 혈소판 334,000/μL로 측정되었고 C-반응 단백질 50 mg/L, 적혈구 침강속도 52 mm/hour로 상승된 상태였다. 크레아티닌 2.79 mg/dL (정상 0.7-1.7 mg/dL), AST 21 IU/L, ALT 13 IU/L, 총 빌리루빈 0.26 mg/dL, 알부민 3.4 g/dL였다.

위내시경에서 전정부에 흰 삼출액으로 덮인 크고 깊은 궤양이 관찰되었으며 대장내시경에서 맹장부터 직장까지 이르기까지 점막의 부종과 홍반을 동반한 점막과 정상 점막이 혼재하여 있었고, 그 사이사이에 깊은 궤양들이 관찰되어 상행결장과 직장에서 조직 검사를 시행하였다(Fig. 1). 조직 생검 결과 H&E 염색에서 거대세포바이러스(cytomegalovirus, CMV) 핵내 봉입체가 발견되었고(Fig. 2A, 3A), CMV 항원에 대한 면역조직화학염색에서 양성반응을 보였다(Fig. 2B, 3B). Ganciclovir의 항바이러스제 치료 시작 후 증상 호전 소견이 관찰되었으며 궤양의 재발없이 외래에서 추적 관찰 중이다.

진단: 거대세포바이러스 위장관 감염

1957년 Weller에 의해 밝혀진 CMV는 이중나선 DNA 구조로 헤르페스 바이러스군에 속하며 면역기능이 저하된 환자의 주요한 병원체로 주로 면역억제자에서 발생한다.¹ CMV의 감염은 주로 밀접한 사람끼리 반복적인 접촉에 의해 전파되는데, 침이나 기침, 재채기를 통해 나온 입자로 전파되거나 성교, 수혈, 장기이식 또는 태반을 통해 감염될 수 있다. 국내의 경우, CMV의 토착 유행지역(endemic area)으로 성인에서 거의 100%에 가까운 IgG 양성을 보이고 있다. 임상 양상으로는 폐렴, 장염, 망막염, 뇌수막염, 부비동염, 담관염 등이 보고되고 있으나, 출혈을 동반한 위장관 질환은 많이 보고되지 않는다.^{2,3}

CMV의 위장관 감염은 대장이 가장 흔한 침범 장소이나 구강부터 직장까지 어디에서나 발생 가능하며, 상부위장관에서 발생한 경우, 연하통, 가슴쓰림, 오심, 구토, 궤양 등이 흔하고, 하부위장관에서 발생한 경우에는 설사, 복통, 혈변, 미란, 궤양, 심한 경우 천공이 발생할 수 있다.⁴

내시경 소견으로는 정상 점막으로 관찰되는 경우도 있으며 발적, 미란, 출혈, 궤양, 용종 등 다양한 형태로 나타날 수 있어 진행성 위암으로 착각하는 경우도 있다.^{5,6} 따라서 CMV 진단은 조직 생검을 통한 바이러스를 직접 확인하거나 적절한

© This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Copyright © 2021. Korean Society of Gastroenterology.

교신저자: 양희찬, 54907, 전주시 덕진구 건지로 20, 전북대학교병원 소화기내과

Correspondence to: Hee Chan Yang, Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, Jeonbuk National University Hospital, 20 Geonji-ro, Deokjin-gu, Jeonju 54907, Korea. Tel: +82-63-250-1533, Fax: +82-63-254-1609, E-mail: yangh-c@hanmail.net, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9847-5343>

Financial support: None. Conflict of interest: None.

Fig. 1. Endoscopic findings. (A) Endoscopic finding of the gastric lesions. It shows a huge, deep ulcerative lesion on the antrum, covered with white exudate, with relatively clear margin. (B) Colonoscopic finding. It shows erythematous mucosa and ulcerative lesion from the cecum to the rectum with multiple mucosal defects.

Fig. 2. Pathologic findings. (A) Stomach mucosa showing ulcerative inflammation with some cells exhibiting enlarged nuclei with intranuclear nucleoli-like inclusion (inset) (stomach, H&E stain, ×400). (B) Immunohistochemical stain for cytomegalovirus showing positive cells in the lamina propria of gastric mucosa (stomach, H&E, ×400).

Fig. 3. Pathologic findings. (A) Diffuse inflammatory cell infiltration in lamina propria with cryptitis and crypt abscess (colon, H&E stain, ×400). (B) Immunohistochemical staining for cytomegalovirus showing positive cells in lamina propria (colon, Immunohistochemical stain, ×400).

환경에서 바이러스를 배양하거나 CMV DNA를 검출함으로써 가능하다. 정상 세포보다 3-4배가량의 크기(25-35 μm)를 가지고, H&E 염색 하에서 주위의 투명한 혼란을 갖는 호염기성 핵내 봉입체와 과립형의 세포질 내 봉입체를 가진 거대세포를 관찰할 경우 CMV 감염임을 진단할 수 있다.⁷ 다른 진단 방법은 환자의 검체에서 바이러스의 DNA를 검출하고 측정하는 것으로 CMV의 존재 여부를 확인하는 정성적인 검사와 바이러스의 양을 측정하는 정량적인 검사가 있다. 정성 검사에서 양성이라 하더라도 반드시 활성화된 감염을 의미하지는 않는다. 따라서 정량 검사를 통해 바이러스 DNA의 수치의 확인이 필요하며 250 copies/mg 이상의 바이러스 검출 시 민감도와 특이도가 높은 것으로 보고되고 있다.⁸

CMV 위장관 감염은 면역기능이 정상인 환자에서 특별한 치료 없이 보존 치료만으로 치유될 수 있어 항바이러스제를 사용하지 않을 수 있으나, 지속적으로 면역기능 저하 상태인 환자의 경우 적절한 치료 없이는 CMV 감염의 진행과 그에

따른 사망률이 높아 적절한 항바이러스 치료를 권장하고 있다. 항바이러스제 일차약제로 14일에서 21일동안 ganciclovir 5 mg/kg 또는 경구용 valganciclovir 900 mg을 사용하며, ganciclovir 내성 CMV 감염의 경우 foscarnet이나 cidofovir를 치료에 사용할 수 있다.⁹

이번 증례는 위와 대장을 동시에 침범한 거대세포바이러스 위장관 감염 증례이다. 거대세포바이러스 감염은 위장관 어느 부위에도 발생할 수 있으며 위, 소장, 대장을 단독으로 침범하는 경우는 종종 보고되고 있으나 여러 위장관을 동시에 침범하는 경우는 아주 드물기 때문에 흥미로웠던 증례이기에 보고하는 바이다.

REFERENCES

1. Craig JM, Macauley JC, Weller TH, Wirth P. Isolation of intranuclear inclusion producing agents from infants with illnesses resembling cytomegalic inclusion disease. Proc Soc Exp Biol

- Med 1957;94:4-12.
2. Merigan TC, Resta S. Cytomegalovirus: where have we been and where are we going? *Rev Infect Dis* 1990;12(Suppl 7):S693-S700.
3. Hinnant KL, Rotterdam HZ, Bell ET, Tapper ML. Cytomegalovirus infection of the alimentary tract: a clinicopathological correlation. *Am J Gastroenterol* 1986;81:944-950.
4. Cheung AN, Ng IO. Cytomegalovirus infection of the gastrointestinal tract in non-AIDS patients. *Am J Gastroenterol* 1993;88:1882-1886.
5. Vachon GC, Brown BS, Kim C, Chessin LN. CMV gastric ulcer as the presenting manifestation of AIDS. *Am J Gastroenterol* 1995;90:319-321.
6. Laguna F, Garcia-Samaniego J, Alonso MJ, Alvarez I, Gonzalez-Lahoz JM. Pseudotumoral appearance of cytomegalovirus esophagitis and gastritis in AIDS patients. *Am J Gastroenterol* 1993;88:1108-1111.
7. Culpepper-Morgan JA, Kotler DP, Scholes JV, Tierney AR. Evaluation of diagnostic criteria for mucosal cytomegalic inclusion disease in the acquired immune deficiency syndrome. *Am J Gastroenterol* 1987;82:1264-1270.
8. Wethkamp N, Nordlohne EM, Meister V, Helwig U, Respondek M. Identification of clinically relevant cytomegalovirus infections in patients with inflammatory bowel disease. *Mod Pathol* 2018;31:527-538.
9. Nelson MR, Connolly GM, Hawkins DA, Gazzard BG. Foscarnet in the treatment of cytomegalovirus infection of the esophagus and colon in patients with the acquired immune deficiency syndrome. *Am J Gastroenterol* 1991;86:876-881.